


# Produit scalaire – Fiche de cours

## 1. Le produit scalaire

### a. Définition

Le produit scalaire de deux vecteurs non nuls  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le réel suivant :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$




### b. Autres expressions du produit scalaire

#### - projeté orthogonal

$\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont deux vecteurs, C et D se projettent orthogonalement en  $C'$  et  $D'$  sur la droite (AB). On a alors :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'}$$



#### définition analytique

Si dans un repère orthonormal,  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont pour coordonnées respectives  $(x, y)$  et  $(x', y')$  alors :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

### - définition de la norme

Le produit scalaire de deux vecteurs non nuls  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  peut être défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

On pourra utiliser la relation suivante :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

### c. Propriétés de bilinéarité

- symétrie :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

- bilinéarité : pour tous réels a et b

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad \text{et} \quad (a \cdot \vec{u}) \cdot (b \cdot \vec{v}) = a \cdot b \times \vec{u} \cdot \vec{v}$$


### d. Critère d'orthogonalité

$$\begin{cases} \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ orthogonaux} \\ \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \end{cases}$$

## 2. Relations métriques dans un triangle

### - Relations d'Al-Kashi

Soit un triangle ABC




$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2 \cdot bc \cdot \cos \hat{A} \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2 \cdot ac \cdot \cos \hat{B} \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2 \cdot ab \cdot \cos \hat{C} \end{aligned}$$

### - Théorème de la médiane

Soit I le milieu de [AB] et M un point du plan. On a alors :


$$\overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = 2 MI^2 + \frac{\overrightarrow{AB}^2}{2}$$



### - Formule des sinus

La surface d'un triangle est définie par :

$$S = \frac{1}{2} \cdot bc \cdot \sin \hat{A}$$



Une conséquence directe de la formule des aires est :

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$$

## 3. Lieux de points

### - Lignes de niveaux

Résoudre une ligne de niveau de valeur le réel  $k$  consiste à caractériser l'ensemble des points M du plan tel que  $f(M)=k$

Exemple :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 100$$