

Calcul intégral – Exercices – Devoirs

Exercice 1 corrigé disponible

Pour tout entier n de $\mathbb{N}^*$, on considère l'intégrale : $I_n = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$

1. (a) Etudier pour tout $x \in]0; +\infty[$, les variations de (I_n) .

(b) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n \geq 0$

Conclure sur la nature de la suite

2. Démontrer que l'on a : $\frac{1}{n+1} < I_n < \frac{1}{n}$

3. En déduire la limite de I_n .

Exercice 2 corrigé disponible

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $I_n = \int_0^{\pi/4} x^n \sin(2x) dx$. On ne cherchera pas à calculer I_n .

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $0 \leq I_n \leq \left(\frac{\pi}{4}\right)^{n+1}$

2. Quelle est la limite de I_n ?

Exercice 3 corrigé disponible

Calculer les intégrales suivantes :

$$(a) \int_{\ln 2}^{\ln 3} 4e^t dt \quad (b) \int_0^1 te^{t^2-1} dt \quad (c) \int_1^2 \frac{t^3}{t^4+1} dt$$

Exercice 4 corrigé disponible

1. Déterminer a , b et c tel que pour tout $x \neq -2$:

$$\frac{x^2}{(x-1)^2} = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$$

2. En déduire $I = \int_2^5 \frac{x^2}{(x-1)^2} dx$

Exercice 5 corrigé disponible

Calculer les intégrales suivantes :

$$(a) \int_0^4 (t-3) dt \quad (b) \int_4^{-1} (t^2-4t) dt \quad (c) \int_1^2 \left(t^2 - \frac{1}{t}\right) dt$$

Exercice 6 corrigé disponible

Calculer les intégrales suivantes :

$$(a) \int_1^4 \left(\frac{1}{2\sqrt{t}} - \frac{1}{t}\right) dt \quad (b) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos t) dt \quad (c) \int_0^{\pi} (\sin(2t)) dt$$

Exercice 7 corrigé disponible

Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. I = \int_0^1 e^{1-2x} dx & 5. M = \int_0^1 5^x dx \\ 2. J = \int_1^2 \frac{x^3}{x^4+1} dx & 6. N = \int_0^{1/2} \frac{3x}{1-x^2} dx \\ 3. K = \int_0^1 \cos(x) e^{\sin(x)} dx & 7. O = \int_0^1 x(x^2+2) dx \\ 4. L = \int_0^1 \frac{1}{(3x+1)^4} dx & 8. P = \int_{-1}^2 3^x dx \end{array}$$

Exercice 8 corrigé disponible

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$.

1. Vérifier que pour tout x , $f(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x}$.

2. En déduire la valeur de l'intégrale, $J = \int_0^1 f(x) dx$.

Exercice 9 corrigé disponible

1. (a) Soit f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x(\ln x - 1)$.

Calculer $f'(x)$ pour tout $x > 0$.

(b) En déduire $\int_1^e \ln x dx$.

2. Montrer que l'on a $\int_0^1 \frac{e^{2t}}{e^{2t}+1} dt = \ln \sqrt{\frac{e^2+1}{2}}$

Exercice 10 corrigé disponible

On se propose de déterminer une valeur approchée à 10^{-1} près de l'intégrale

$L = \int_0^1 f(x) dx$ où f est la fonction définie sur $[0; 1]$ par

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{2-x}$$

1. Démontrer que pour tout $x \in [0; 1]$:

$$\frac{1}{e} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$$

2. Soient J et K les intégrales définies par :

$$J = \int_0^1 (2+x)e^{-x} dx \quad ; \quad K = \int_0^1 x^2 f(x) dx$$

(a) Calculer J et montrer que $J = 3 - 4e^{-1}$.

(b) Utiliser l'encadrement de la question 1. pour démontrer que :

$$\frac{1}{3e} \leq K \leq \frac{1}{6}$$

(c) Démontrer que $J + K = 4L$.

(d) En déduire un encadrement de L , puis donner une valeur approchée de L à 10^{-1} près.

Exercice 11

On considère la suite (x_n) définie pour tout entier naturel n non nul par :

$$x_n = \int_0^1 t^n \cos t dt$$

1. (a) Montrer que la suite (x_n) est à terme positifs.

(b) Montrer que tout $n \in \mathbb{N}$ et pour $t \in [0; 1]$ on a $t^{n+1} \cos t \leq t^n \cos t$.

(c) En déduire les variations de la suite (x_n) .

(d) Que peut-on en déduire quant à la convergence de la suite (x_n) ?

2. (a) Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, $x_n \leq \frac{1}{n+1}$.

(b) En déduire la limite de la suite (x_n) .

Exercice 12

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par :

$$u_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt$$

1. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $u_n \geq 0$.

2. (a) Démontrer que pour tout réel t de l'intervalle $[0; 1]$ et pour tout entier naturel non nul n :

$$(1-t)^n e^t \leq e \times (1-t)^n$$

(b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq \frac{e}{n+1}$.

3. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 13

Calculer la valeur exacte des intégrales suivantes :

$$I = \int_1^6 \frac{1}{(x-3)^3} dx$$

$$J = \int_{-1}^4 \frac{1}{3x+5} dx$$

$$K = \int_{-1}^1 x e^{3x^2-1} dx$$

Exercice 14

Calculer la valeur exacte des intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(2x+1)^2} dx$$

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{(\cos x)^3} dx$$

Exercice 15 corrigé disponible

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^{-x}} dx$$

1.a. Montrer que $u_0 + u_1 = 1$

1.b. Montrer que $u_1 = 1 + \ln \frac{2}{1+e}$ et en déduire u_0

2.a. Montrer pour tout entier naturel que $u_n \geq 0$

2.b. Montrer pour tout entier naturel non nul que $u_n + u_{n+1} = \frac{1-e^{-n}}{n}$

2.c. En déduire que pour tout entier naturel non nul $u_n \leq \frac{1-e^{-n}}{n}$

3. Prouver que (u_n) converge vers une limite à déterminer

Exercice 16 corrigé disponible

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une intégration par partie.

1) $I = \int_1^e x \ln x dx$

4) $I = \int_0^1 (x+2)e^x dx$

2) $I = \int_1^{e^2} \ln t dt$

5) $I = \int_1^2 (t-2)e^{2t} dt$

3) $I = \int_0^\pi (x-1) \cos x dx$

6) $I = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$

Exercice 17

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1.

On note f_n la fonction définie pour tout réel x de l'intervalle $[0; 1]$ par $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$

Pour tout entier $n \geq 1$, on définit le nombre I_n par $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx$

Les représentations graphiques de certaines fonctions f_n obtenues à l'aide d'un logiciel sont tracées ci-après.

1. a) En expliquant votre démarche, conjecturer le sens de variation de la suite (I_n) .

b) Démontrer cette conjecture.

2. Calculer la valeur exacte de I_1 .


3. a) Démontrer que, pour tout réel $x \in [0; 1]$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $\frac{1}{1+x^n} \leq 1$

b) En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $I_n \leq 1$.

4. Démontrer que, pour tout réel $x \in [0; 1]$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $1 - x^n \leq \frac{1}{1+x^n}$.

5. Calculer l'intégrale $\int_0^1 (1 - x^n) dx$.

6. À l'aide des questions précédentes, encadrer I_n pour tout entier naturel $n \geq 1$, démontrer que la suite (I_n) est convergente et déterminer sa limite.



Exercice 18

On considère les suites (x_n) et (y_n) définies pour tout entier naturel n non nul par :

$$x_n = \int_0^1 t^n \cos t \, dt \quad \text{et} \quad y_n = \int_0^1 t^n \sin t \, dt$$

- 1) a) Montrer que la suite (x_n) est à termes positifs.
- b) Étudier les variations de la suite (x_n) .
- c) Que peut-on en déduire quant à la convergence de la suite, (x_n) ?
- 2) a) Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul :

$$x_n \leq \frac{1}{n+1}$$

- b) En déduire la limite de la suite (x_n) .
- 3) a) À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que, pour tout entier naturel n non nul :

$$x_{n+1} = -(n+1)y_n + \sin(1)$$

- b) En déduire que : $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$
- 4) On admet que, pour tout entier naturel n non nul :

$$y_{n+1} = (n+1)x_n - \cos(1)$$

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} ny_n$

Exercice 19

Étude de la suite (u_n) définie par pour tout entier naturel n , $u_n = \int_0^n f(x) \, dx$

On ne cherchera pas à calculer explicitement u_n .

1. Donner une interprétation géométrique de u_n .
2. Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ?
3. a. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f(x) = 1 + \frac{x}{e^x - x}$$

- b. Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = n + \int_0^n \frac{x}{e^x - x} \, dx.$$

- c. En déduire la limite de u_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 20

Étude de la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - n$

On a donc, pour tout entier naturel n , $v_n = \int_0^n \frac{x}{e^x - x} \, dx$.

On se propose d'étudier la convergence de la suite (v_n) .

1. Montrer que la suite (v_n) est croissante.

2. a. Montrer que, pour tout réel x positif ou nul, $e^x - x \geq \frac{e^x}{2}$.

- b. En déduire que, pour tout entier naturel n , $v_n \leq \int_0^n 2xe^{-x} \, dx$.

- c. En effectuant une intégration par parties, exprimer $\int_0^n 2xe^{-x} \, dx$ en fonction de n .

- d. En déduire que, pour tout entier naturel n , $v_n \leq 2$.

3. La suite (v_n) est-elle convergente ?

Exercice 21

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$$

1. (a) Étudier les variations de f sur $]0 ; +\infty[$
- (b) En déduire le signe de $f(x)$ sur $]0 ; +\infty[$

Soient les fonctions g et h définies sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x}$ et

$$h(x) = \ln x + 1.$$

Soit C_g et C_h leurs courbes représentatives.

2. (a) Représenter C_g et C_h . Quelles sont les coordonnées de I , intersection de C_h avec l'axe des abscisses ?
- (b) On note A l'aire du domaine délimité par C_g et C_h et les droites d'équation $x = e^{-1}$ et $x = 1$. Déterminer A .

Exercice 22

On considère les fonctions $f: x \mapsto \frac{4x-x^2}{(x-2)^2}$ et $g: x \mapsto 4x - x^2$ sur $]2; +\infty[$.

- 1) Etudier les positions relatives des deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- 2) Calculer l'aire, en unité d'aire, du domaine du plan compris entre les deux courbes et les droites d'équation $x = 3$ et $x = 5$.

Exercice 23

A l'aide d'une double intégration par parties, calculer la valeur exacte des intégrales suivantes :

$$C = \int_{-\pi}^{\pi} e^{2t} \cos(6t) dt$$

Exercice 24

On désigne par n un entier relatif différent de -1 .

1. Calculer l'intégrale : $I_n = \int_1^e t^n \ln t \, dt$.
2. En déduire le calcul de l'intégrale : $J_n = \int_1^e t^n (\ln t)^2 \, dt$.

Exercice 25

On désigne par n un entier naturel, on pose : $\int_0^n t^2 e^{-t} dt$

1. Calculer I_n en fonction de n .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$